

KEGLESNIT (KONISATIO) MED ELSLYNGE

Baggrund: Hvis du har fået svar at du er HPV positiv ved en celleprøve eller hjemmetest, kan det være tale om en lille risiko for at udvikle celleforandringer, derfor tilbyder vi keglesnitsoperation.

Operation: Det foretages ambulant i lokalbedøvelse hvor keglen skæres ud med en elektrisk slynge og sendes til mikroskopisk undersøgelse.

Komplikationer: Blødning efterfølgende ses sjældent. Sker der en efterblødning, plejer den at finde sted kort efter operationen eller på ca. 10 dagen.

Du får en recept på nogle blødningsstoppende piller du kan tage ved behov.

Efterforløbet: i de første 14 dage efter indgrebet vil der ofte være brunligt udflåd. Kar- og hav bad, samleje samt tunge løft skal undgås i denne periode.

Vævet bliver sendt til undersøgelse hos patologerne, **og du skal huske selv at ringe for svar 14 dage efter indgrebet.**

Du skal komme til kontrol med celleprøve ca. 6 måneder efter indgrebet.

Læs mere om celleforandringer og livmoderhalskræft

Antallet af kvinder, som rammes af livmoderhalskræft, har været faldende i 40 år. Du kan læse meget mere om sygdommen, symptomer og behandlingsmetoder hos Kræftens Bekæmpelse <https://www.cancer.dk/livmoderhalskraeft-collumcancer/>

Rev.PC, 7/ 2019 revideres 7/ 2021

Konus PM

www.gynaekolog.dk

E mail: kontakt@gynaekolog.dk

Brug gerne lægevejen mhp. kontakt til os.

[Tel:48176250](tel:48176250)