

Tilgrundegået graviditet/ missed abortion.

Det sker i 20-25% af alle graviditeter at udviklingen stopper tidligt. Oftest er det fordi graviditeten ikke er levedygtig af en eller anden årsag.

Der vil komme en spontan blødning på et tidspunkt, men de fleste foretrækker at få blødningen sat i gang. Det kan man gøre med medicinske behandling.

Du får udleveret 2 poser med flg.:

1. Pose – 1 tbl. Mifegyne - Enkelte får efter kort tid kvalme og begynder at bløde. Du skal oplægge Cytotec som anført alligevel.
2. Pose – 4 tabletter tbl Cytotec 0,2 mg. Disse lægges hjemme højt op i skeden ca 24 - 48 timer efter indtagelse af tbl Mifegyne. Samtidig tages smertestillende som anvist.

Du må ikke tage Mifegyne, hvis du lider af: Kendt allergi overfor Mifegyne, svær astma (ej behandlet), arvelig porfyri (stofskiftesygdom), nyresvigt, binyre-svigt, leversvigt, underernæring eller fejl i blodets evne til at størkne.

Cytotec får livmoderen til at trække sig sammen, så den tømmer sig. Det kan give kraftige menstruationssmerter og 28% får kvalme, 17% opkastning og 3% diarre efter indtagelse.

Du må ikke tage Cytotec, hvis du lider af: Kendt allergi overfor Cytotec, svær åreforkalkning, hjertekramper eller grøn stær.

Der anbefales som smerterbehandling -

Tbl. PAMOL – 500 mg – 2 tbl. Hver 6. time.

Tbl. IBUPROFEN – 200 mg 2 tbl. Hver 6. time

De fleste aborterer i løbet af 4-5 timer efter oplægning af Cytotec og næsten alle indenfor det første døgn. Der vil være blødning, som kan være kraftigere end en almindelig menstruation, eventuelt med klumper. Kommer der lidt tabletresten ude, gør det ikke noget, da det virksomme stof er blevet optaget.

I meget få tilfælde kan blødningen være så kraftig, at der er behov for akut hjælp. Hvis du oplever blødning over dobbelt menstruationsstyrke i mere end 2 timer eller meget stærke smerter, kan du altid henvende dig her i klinikken i åbningstiden hverdage 8-15. Udenfor klinikkens åbningstid kan du døgnet rundt kontakte akutsygeplejersken på

Missed abort

www.gynaekolog.dk

E mail: kontakt@gynaekolog.dk

Brug gerne lægevejen mhp. kontakt til os.

[Tel:48176250](tel:48176250)

Hillerød hospitalet tlf. 48295965. Du skal medbringe denne vejledning, der tjener som henvisning. I nødstilfælde må du ringe 1813

Dag 5-7. Kontrol

Du får lavet en ultralydsskanning, for at se om afstødningen er sket.

Hos ca. 5 % har afstødning endnu ikke fundet sted. Forløbet herefter afhænger både af dine ønsker og af vores vurdering. Behandlingsmulighederne er et nyt forsøg med Cytotec eller en udskrabning.

Almindeligvis vil der være menstruationslignende blødning i ca. 2-4 uger.

Efter udstødelsen af graviditeten er det normalt at bløde af varierende styrke helt hen til næste menstruation. Mens du bløder anbefaler vi at du bruger bind og ikke tampon. Du må gerne tage brusebad, men ikke karbad eller hav bad. Alt for at forhindre infektion. Brug kondom ved samleje når du bløder.

Rev.PC, 7/ 2019 revideres 7/ 2021

Missed abort

www.gynaekolog.dk

E mail: kontakt@gynaekolog.dk

Brug gerne lægevejen mhp. kontakt til os.

[Tel:48176250](tel:48176250)