

## HSU (Ultralydsvejledt undersøgelse af æggeledeerne)

### Formål

At undersøge om der er passage i dine æggeledere. Sædcellerne skal kunne passere ud i æggeledeerne, og det befrugtede æg transporteres tilbage til livmoderen. Undersøgelsen vil også skylle æggeledeerne igennem så passageforholdene forbedres, evt. normaliseres.

### Gør det ondt?

Ved normale forhold er undersøgelsen ganske smertefri. Men ved forhindringer i æggeledeerne kan opleves mindre menstruationssmerter.

### Hvornår er det bedste tidspunkt for undersøgelsen?

Efter menstruationen og før ægløsningstidspunktet dvs. ca. 5. til 11. dagen efter menstruationens start.

### Hvordan udføres undersøgelsen?

Vi anbefaler, at du hjemmefra tager 1 g. Panodil (2 tabletter à 500 mg), hvis du er nervøs.

I gynækologisk leje foretages afvaskning af livmoderhalsen, derefter indføres et tyndt og blødt plastkrør (kateter) gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. For at kateteret ikke skal falde ud ved undersøgelsen, fyldes luft i en lille ballon, som sidder i spidsen af kateteret.

Ultralydsskanning forgår gennem skeden, medens lægen sprøjter væske (lokalbedøvelse) og luft igennem kateteret. Væsken løber ud gennem æggeledeeren og kan ses som væskeophobning bag livmoderen, hvis der er fri passage i æggeledeerne. Undersøgelsen tager ca. 5-10 minutter.

### Kan jeg gå på arbejde bagefter og have et normalt seksualliv?

Efter undersøgelsen kan du bløde lidt og en del af afvasknings- og gennemskylningsvæsken kan løbe ud af skeden. Du kan gå på arbejde. Du kan have normalt samliv før og efter undersøgelsen.

Rev. PC, 3/2019, rev. igen 3/2021