

HYSTEROSKOPI

(kikkertundersøgelse af livmoderen)

Denne undersøgelse foretages, hvis du for eksempel har blødningsproblemer eller problemer med at blive gravid.

Før du kommer til undersøgelsen.

Undersøgelsen kan **ikke** foretages, hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt at bruge prævention, hvis du skal undersøges senere end 12 dage efter første menstruationsdag.

Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved at blive gravid, er det vigtigt, at du **ikke har menstruation**. Hvis du får menstruation omkring undersøgelsesdagen, beder vi dig ringe til os så tidligt som muligt for at aftale en anden tid. Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer, kan den gennemføres, selv om du bløder – blot det ikke er for kraftigt.

Det anbefales du tager Panodil 1 g (2 x 500 mg Panodil) samt Ipren 200 mg ca. 1 time før undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen.

Undersøgelsen foregår ved, at lægen fører et lille kikkertinstrument med en diameter på 5 mm gennem skeden op i livmoderhulen. For at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoderhulen skyllet med vand. I kikkerten kan man få et billede af livmoderens indvendige slimhinde. Undersøgelsen tager 5-10 minutter og foregår som regel uden bedøvelse. Hvis der ses en lille polyp eller muskelknude (fibrom), som kan være forårsag til dit problem, kan den også fjernes med en lille saks, men den beslutning vil lægen tage under undersøgelsen eller det vil være aftalt på forhånd.

Efter undersøgelsen.

Du kan forvente let blødning op til nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget.

Svar på undersøgelsen.

Hvis der er fjernet væv eller taget en vævsprøve, skal du efter ca. 2 uger ringe til klinikken for svar på mikroskopi af det væv, der er taget ud.

Rev. PC, 3/2019, rev. igen 3/2021

Hysteroskopi

www.gynaekolog.dk

E mail: kontakt@gynaekolog.dk

Kontakt os via www.lægevejen.dk

[Tel: 48 17 62 50](tel:48176250)